

Moviprep - Einnahme



MVZ für Gastroenterologische
Endoskopie im Salewa-Haus

Dr. med. Manfred Burgstaller
Dr. med. Michael Zilly

Fachärzte für Innere Medizin – Gastroenterologie

Bahnhofstraße 29, 86150 Augsburg

Telefon (08 21) 15 60 56

Telefax (08 21) 15 84 25

www.gastroenterologen-salewa-haus.de

Termin: _____

Uhrzeit: _____

Bitte kommen Sie 10 Minuten 15 Minuten davor zu uns.

Vorbereitung:

Ab fünf Tage vor der Untersuchung:

keine Mahlzeiten mit kleinen Körnern: Müsli, Körnerbrot oder -brötchen, Tomaten, Weintrauben, Kiwi, Gurken usw.; keine Eisenpräparate

Ab drei Tage vor der Untersuchung:

keine Blattsalate, Pilze, Paprika

Am Tag vor der Untersuchung:

- Für Termine bis 10 Uhr: letzte Mahlzeit = Frühstück am Vortag der Untersuchung: eine Scheibe Weißbrot mit Butter und Marmelade
- Für Termine ab 10:15 Uhr: letzte Mahlzeit = Mittagessen am Vortag der Untersuchung: Suppe ohne Einlagen.

Anschließend nur noch klare Flüssigkeiten wie stilles Wasser, klare Brühe, Tee, klare Säfte trinken.

Nach dem 1. Schluck Moviprep bitte nichts mehr essen!

Zubereitung: Zuerst nur einen durchsichtigen Beutel öffnen, die inneren Beutel „A“ sowie „B“ entnehmen und zusammen in ein Gefäß geben, das mindestens 1 Liter Flüssigkeit fasst. Fügen Sie nun 1 Liter Wasser dazu und verrühren Sie beides, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat und die Lösung klar oder allenfalls leicht trüb ist. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern.

Trinken Sie den ersten Liter Moviprep innerhalb von 1-2 Stunden. Versuchen Sie so alle 10-15 Minuten ein Glas Moviprep zu trinken. Weitere zusätzliche Flüssigkeit wie unten angegeben!

Bereiten Sie zum angegebenen 2. Zeitpunkt den verbleibenden 2. Beutel (Inhalt A+B) in gleicher Weise zu und starten Sie erneut. Immer aufgeteilte Einnahme – nie die kompletten 2 Liter Moviprep (2xBeutel A+B) auf einmal trinken!

Wichtig: Zu jedem Liter Moviprep zusätzlich je 1 Liter klare Flüssigkeit trinken, z.B. Wasser, klare Suppe, Tee, helle limonadenhaltige Getränke (keine Cola), Obstsaft (keine roten Säfte / kein Fruchtfleisch), aber keine Milch oder Milchprodukte, keinen Kaffee.

Während der letzten beiden Stunden vor der Untersuchung bitte nichts mehr trinken!

- Termin vor 10 Uhr: Start mit Beutel 1 (A+B) am Vortag um 13 Uhr
Start mit Beutel 2 (A+B) am Vortag um 19 Uhr
- Termin 10 bis 14 Uhr: Start mit Beutel 1 (A+B) am Vortag um 19 Uhr
Start mit Beutel 2 (A+B) am Untersuchungstag um 6 Uhr
- Termin nach 14 Uhr: Start mit Beutel 1 (A+B) am Vortag um 19 Uhr
Start mit Beutel 2 (A+B) am Untersuchungstag um 8 Uhr